

Trombocyter

Synonymer

TPK

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-TPK

Metod

Metodtyp

Optisk mätning, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10⁹/L

NPU-Kod

NPU03568

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall	
	<7 d	120 - 350	
	7 d - <365 d	170 - 400	
	1 år - <18 år	150 - 350	

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall	
		Kvinnor	Män
	>=18 år	165 - 387	145 - 348

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-19

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.